



## Inhalationstid och dosering med Maxin

Vuxna: kroppsvikt över 35 kg.  
Barn: kroppsvikt under 35 kg\*/

### Akutbehandling

### Fyll i

- |  |      |
|--|------|
| ● <b>Bricanyl</b> inhalationsvätska 2,5 mg/ml (2 ml outspädd) eller <b>Ventoline</b> inhalationsvätska 5 mg/ml (2 ml outspädd):<br><br>Vuxna: 2 min inhalation + upprepas v b efter 15 min uppehåll.<br>Barn: 1 min inhalation + upprepas v b efter 15 min uppehåll. **/   | 2 ml |
| ● Lika delar <b>Bricanyl</b> 2,5 mg/ml (1 ml) och <b>Atrovent</b> 0,25 mg/ml (1 ml) eller lika delar <b>Ventoline</b> 5 mg/ml (1 ml) och <b>Atrovent</b> 0,25 mg/ml (1 ml)<br><br>Vuxna: 2 min inhalation + upprepas v b efter 15 min uppehåll.<br>Barn: 1 min inhalation + upprepas v b efter 15 min uppehåll. **/  | 2 ml |
| ● <b>Adrenalin</b> 1 mg/ml (2 ml) eller (1 ml adrenalin kan spädas med 1 ml 0,9% NaCl):<br><br>Vuxna: 1 min inhalation + upprepas v b efter 15 min uppehåll.<br>Barn: 0,5 min inhalation + upprepas v b efter 15 min uppehåll. **/   | 2 ml |
| ● <b>Pulmicort</b> suspension för nebulisator 0,125 mg/ml, 0,25 mg/ml och 0,5 mg/ml:<br>Önskad tillförsel av 1 ml = 4 min inhalation, 2 ml = 8 min inhalation. **/<br>Pulmicort kan blandas med 0,9% NaCl och med lösningar innehållande terbutalin (Bricanyl), salbutamol (Ventoline), natriumkromoglikat (Lomudal) eller ipratropiumbromid (Atrovent).   | 2 ml |
| ● <b>Combivent</b> lösning för nebulisator, endosbehållare 2,5 ml<br>Vuxna: 2–4 min inhalation + upprepas vid behov efter 15 min uppehåll.   | 2 ml |
| ● Patienten iakttages kliniskt avseende biverkningar och effekt. Vid otillräcklig effekt och ringa biverkningar kan ytterligare inhalation ges. Individuell dosering eftersträvas.<br><br>*/ Andningsminutvolymen är relaterad till kroppsvikten.<br>Därmed erhålles en naturligt avpassad dos vid inhalation på tid.<br><br>**/ Vid behandling med flödesmetod tillämpas dubbel inhalationstid eftersom drygt hälften av aerosolen försvinner ut i omgivningen. |      |

Ha som regel att fylla 2 ml vätska i fotflaskan.

Maximal fyllnadsvolym i fotflaskan är 5 ml.

Maxin nebuliserar 0,2 – 0,25 ml vätska per minut.

Undvik förväxlingsrisk. Kasta vätskan som blir kvar efter utförd inhalation.

Linje för 2 ml

